



SYNALAR[®] Espuma

Acetónido de Fluocinolona
Aerosol

COMPOSICIÓN

Cada gramo contiene: Acetónido de Fluocinolona (DCI), 0,00025 g

Excipientes: Ácido cítrico anhidro, propilenglicol, decil oleato, alcohol cetostearílico y cetostearil sulfato de sodio, alcohol β -feniletílico, parahidroxibenzoato de metilo, parahidroxibenzoato de propilo, agua purificada, tetrafluoroetano y dimetileter.

PROPIEDADES

Synalar espuma es un preparado dotado de una intensa actividad antiinflamatoria, antipruriginosa y vasoconstrictora tópica.

INDICACIONES

Synalar espuma está indicado en el tratamiento de una amplia variedad de afecciones inflamatorias, pruriginosas y alérgicas de la piel, tales como: psoriasis, dermatitis atópica, dermatitis seborreica, dermatitis de contacto, dermatitis eczematosa, liquen plano, neurodermatitis, psoriasis intertriginosa, eczema numular, liquen simplex crónico, lupus discoide eritematoso, dermatitis exfoliativa, intertrigo, otitis externa y dermatitis por estasis.

POSOLOGÍA Y MODO DE EMPLEO

La administración podrá realizarse en:

Cura abierta: 2-3 veces al día sobre la zona afectada y frotando suavemente hasta su total desaparición.

Cura oclusiva: Una vez al día, aplicando sobre la zona afectada y cubriendo ésta con vendaje de plástico no poroso. Este tipo de tratamiento no debe exceder de dos meses.

CONTRAINDICACIONES

Synalar espuma está contraindicado en pacientes con una historia de hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

Lesiones víricas de la piel: Viruela, Varicela, Herpes Zóster. Lesiones tuberculosas de la piel y lútéicas.

PRECAUCIONES

El uso prolongado de corticoides tópicos puede producir atrofia de la piel y del tejido subcutáneo. Cuando se aplica en la cara esto puede ocurrir incluso en tratamientos de corta duración.

La aplicación de corticoides sobre grandes superficies del cuerpo puede acarrear una significativa absorción sistémica incluso si no se utiliza la cura oclusiva.

En niños, la administración de corticoides tópicos debe limitarse a períodos cortos de tiempo y a la mínima cantidad efectiva de producto.

En presencia de una infección, debe instituirse una terapia apropiada. De no tener lugar una rápida mejoría, debe suspenderse el tratamiento con Synalar espuma hasta que se haya controlado la infección.

Este preparado no está indicado para uso oftálmico.

ADVERTENCIAS

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de control del dopaje como positivo.

Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar incluso después de usarlo.

INCOMPATIBILIDADES

No se han descrito incompatibilidades formales para este medicamento.

EMPLEO DURANTE EL EMBARAZO

En animales de laboratorio se ha sugerido que el tratamiento de hembras gestantes con corticoides tópicos puede estar relacionado con una mayor incidencia de anormalidades fetales. Aunque en humanos no se ha demostrado que este tipo de fármacos ejerza un efecto adverso sobre el embarazo, no se ha establecido su completa seguridad en mujeres gestantes. Por lo tanto, no se recomienda su uso prolongado o en grandes cantidades en este tipo de pacientes, especialmente durante el primer trimestre del embarazo.

EFFECTOS SECUNDARIOS

En caso de administración reiterada de corticoides tópicos, se ha descrito la aparición de los siguientes efectos locales: quemazón, picor, irritación, sequedad, foliculitis, hipertrichosis, erupciones acneiformes, hipopigmentación, dermatitis perioral, dermatitis alérgica de contacto, maceración dérmica, infección secundaria, atrofia cutánea, estrías y miliaria.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

En caso de ingestión accidental, pueden aparecer cuadros de taquicardia y elevaciones ocasionales de tensión arterial, que ceden sin necesidad de tratamiento médico.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica, Teléfono (91) 562 04 20.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Presérvese del calor.

PRESENTACIONES

Envase aerosol con 15 y 60 gramos de emulsión.

CON RECETA MÉDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Yamanouchi Pharma S.A.

Centro Empresarial El Plantío - c/ Ochandiano, 10 - 28023 MADRID

Fabricado por::

Yamanouchi Pharma S.p.A.

Via delle Industrie, 2 - 280061 Carugate – Milán - ITALIA

MC.IS.276/A